

	J+0	J+1 (lendemain soir – 24h post op)	J+2 (surlendemain soir – 48h post-op)	J+3	J+4 à J+7	J+10	J+21
IMPORTANT	NE PAS CRACHER NI RINCER						
Antibiotique	1 Co 8h après la prise pré- op.	1Co toutes les 8h.	1Co toutes les 8h.	1Co toutes les 8h.	1Co toutes les 8h jusqu'à finir la boîte		
Ibuprofène 600mg	1Co pendant le repas du soir	1Co pendant le repas du matin, midi et soir	1Co pendant le repas du matin, midi et soir	1Co pendant le repas du matin, midi et soir	Non sauf si douleur / gonflement		
Dafalgan 1G	1Co au réveil de l'anesthésie	1Co à 10h, 16h, avant le coucher	1Co à 10h, 16h, avant le coucher	Non, sauf si douleur	Non sauf si douleur		
Hygiène dentaire	Pas de brossage du tout	Brossage soigneux des dents. Pas sur la/les zones opérées	Brossage matin et soir comme d'habitude				
Bain de bouche (Eludril, Corsodyl, Perio- Aid)	Non	Oui : 1' pur le soir	Oui : 1' pur après brossage de dents matin et soir + 1' pur après repas du midi	Oui : 1' pur après brossage de dents matin et soir + 1' pur après repas du midi	Oui : 1' pur après brossage de dents matin et soir + 1' pur après repas du midi	3x / jour Dernier jour	
Elugel	Non	Non	Oui : sur la zone opérée	Oui : la zone opérée	Oui : sur la zone opérée	Oui : sur la zone opérée	Oui : dernier jour
Alimentation	Liquide et froid	Mou et tiède	Alimentation normale mais pas trop chaude. Bien mâcher du côté opposé à la zone opérée	Alimentation normale. Bien mâcher de l'autre côté	Alimentation normale. Bien mâcher de l'autre côté		

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter au 02/649 71 05.
Cabinets Dentaires Digital Dentists